

AVERTISSEMENTS

PRATIQUES AGRICOLES

REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n°18 du 08 Juin 2000 - 1 page

BLE: stade grain laiteux

Septoriose

Sur variétés sensibles non protégées la septoriose a fortement progressé, les F1 sont nettement attaquées et les F2 pratiquement grillées.

Rouille brune

Elle s'est installée tardivement sur variétés sensibles en Vienne et Deux Sèvres.

Symptômes atypiques

Ils n'ont pas évolué depuis une dizaine de jours ; en l'état actuel des analyses effectuées. l'explication la plausible est une réaction de la plante (très variable selon les variétés) vis à vis d'un contexte climatique particulier (courant épiaison-maturation : fortes thermiques amplitudes nuit-jour, températures mini anormalement basses...).

Pucerons

Les populations en parcelles sont pratiquement nulles.

Maintenir la surveillance jusqu'au stade laiteux-pâteux.

TOURNESOL

stade B4 à E1

les parcelles les plus Surveiller

Pucerons

Les populations sont restées faibles.

tardives.

Phomopsis

Des projections devraient intervenir lors du prochain passage pluvieux alors que les cultures les plus développées arrivent à un stade de sensibilité plus élevé.

Les variétés très peu sensibles ou peu sensibles permettent de limiter très fortement le risque phomopsis, une intervention fongicide n'est à envisager que pour les parcelles à bon potentiel ainsi que dans quelques situations particulières (variétés sensibles ou/très sensibles en potentiel limité).

L'évolution du risque sera précisée dans les prochains bulletins.

MAIS : stade 4 à 10 feuilles

Sésamie

Le vol se poursuit.

Les premiers pieds de ponte ont été observés en Charente-Maritime le 30 Mai.

Les préconisations du dernier bulletin sont maintenues.

Dans les secteurs concernés, prévoir la seconde intervention à demi-dose 2 semaines après le 1er passage effectué du 31 Mai au 21 Juin (ou intervenir à pleine dose vers le 10 dans le cas de la stratégie à traitement unique).

Pyrale

premières captures sont intervenues fin Mai; le vol se poursuit de façon très irrégulière avec des captures localement assez importantes (Nord Vienne, Centre Charente).

Sésamie : Maintenir la protection

MAÏS

Pyrale: Début du vol

Service Régional de la Protection des Végétaux 86580 BIARD 2 : 05.49.62.98.25 Fax: 05.49.62.98.26

Imprime à la station d'Avertissements Agricoles de POITOU-CHARENTES

Le Directeur-Gérant L. JUILLARD CONDAT

Publication périodique C.P.P.A.P. nº 2139 AD ISSN n°02294 470





